



Lasiaisen irtauma

Lasiainen on silmää täyttävä geelimäinen rakenne, joka on etuosastaan napakasti kiinni silmän sisäpinnassa (kuva 1). Vuosien myötä lasiainen kuitenkin kutistuu ja lähes kaikilla sen takapinta irtoaa jossain vaiheessa löyhemmistä kiinnityksistään verkkokalvoon (kuva 2). Tällöin on pienehkö riski siihen, että jokin tiukempi kiinnikekohta repäisee verkkokalvolle reiän (kuva 3) ja tällainen reikä voi päästää lasiaistilan nestettä verkkokalvon alle aloittaen verkkokalvon irtauman (kuva 4).

KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3



KUVA 4



Oireet ja hoitoon hakeutuminen

Pelkkä verkkokalvolle syntynyt reikä voidaan rajata polikliinisellä laserhoidolla, jolloin lasiaistilan neste ei pääse aiheuttamaan laajempaa irtaumaa. Jos reiän ympärille on jo syntynyt kookkaampi verkkokalvon irtauma, ei laserhoito enää riitä, vaan irtauma on jo pian alkuvaiheessa kiinnitettävä leikkauksella paikalleen tai muuten seurauksena on lopulta pysyvä näönmenetys. Siksi **varhainen hakeutuminen silmälääkäriin on suositeltavaa**.

Lasiaisirtauman oireita ovat valonvälähdykset ja erilaiset heilahtelevat pilkut ja hiusmaiset juosteet. Verkkokalvon nykäisy voi aiheuttaa verenvuotoa silmän sisälle ja sellaisen potilas kokee mahdollisesti nokisateena tai näön sumeutena. Joka toisessa tapauksessa vuoto on vaarattomammin peräisin silmän sisäpinnan verisuonesta, mutta joka toisessa verkkokalvopeämästä. Siksi noin viikon kuluessa oireiden alusta suositellaan silmälääkärin tekemää tarkastusta, vaikka oireet olisivat lieventyneet. Tarkastuksessa pyritään poissulkemaan mahdolliset verkkokalvovireiät.

Lasiaisen irtoaminen kestää tavallisesti muutamasta päivästä pariin viikkoon ja jos alkutarkastuksessa ei löydy hoidettavia reikiä, niin uusintatarkastuksen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tavallisin lopputarkastuksen ajankohta on noin kuukausi oireiden alusta. Väliaikana on hyvä välttää raskaampia ponnisteluja, jotta lasiainen saisi irrota omia aikojaan rauhallisesti eikä yhtäkkisesti nykäisten. Monella potilaalla lasiainen irtoaa toisessakin silmässä jo parin vuoden kuluessa.

Jos verkkokalvon reikä on jo edennyt suuremmaksi verkkokalvoirtaumaksi, voi oireena olla jatkuva tiivis varjo tai läpinäkymätön verho, jonka lävitse ei näe ehkä kuin hahmoja. **Tällöin silmälääkäriin on hakeuduttava viipymättä**, jotta näön palauttamiseksi tehtävä leikkaushoito ei viivästy tarpeettomasti.